



ÓVULOS VAGINALES

lamecan 
Clotrimazol 200mg

VENTA LIBRE. INDUSTRIA ARGENTINA.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un centro de toxicología, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de toxicología:

-Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

-Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ 4658-7777/
0800-333-0160.

MODO DE CONSERVACIÓN:

Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C.

PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo tres óvulos vaginales.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 58.342.

Genomma Laboratories Argentina S.A.:

Parque Industrial Suárez, espacio primario 1.1 y 1.3, Av. Juan M. de Rosas N° 2969, José León Suárez, San Martín, Buenos Aires. Tel: 0800-444-3666. Director Técnico: Diego Bauerberg – Farmacéutico.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT

¿QUE CONTIENE LOMECAN V?

Cada óvulo contiene:

Clotrimazol200,00 mg

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, propilenglicol, mezcla de ácidos grasos saturados c.s

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

Este medicamento está disponible sin receta. No obstante, Ud. debe utilizarlo con cuidado para obtener los mejores resultados. Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antimicótico.

¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento se utiliza para el tratamiento de infecciones por hongos en la región genital femenina.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Menores de 16 años. No usar en caso de alergia al Clotrimazol, al alcohol cetilestearílico o a cualquiera de los excipientes (reacciones alérgicas producidas por este medicamento u otros similares).

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR LOMECAN V?

Si esta es la primera vez que usted ha presentado síntomas asociados a una infección vaginal, consulte con su médico antes de emplear cualquier tratamiento. Para su uso exclusivo en adultos y mayores de 16 años. Si Ud. está tomando algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este medicamento. Si usted duda de padecer micosis vaginal consulte con su médico antes de utilizar este producto.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO LOMECAN V?

Si los síntomas como picazón y ardor persisten más de 7 días consulte a su médico. Si olvida colocarse el óvulo por la noche, puede continuar el tratamiento a la mañana siguiente. Para lograr una eliminación completa de la infección y prevenir su repetición no se deberá interrumpir el tratamiento, dado que en este caso la infección no estará completamente curada y puede volver. El tratamiento no se debe suspender mientras existan los síntomas, y deberá continuarse hasta completar los 6 días. Use ropa interior femenina de algodón y ropas flojas. Lávese diariamente. Luego de ir al baño, límpiese de adelante hacia atrás, ya que la infección por candida puede ser transmitida desde el intestino. Cambie regularmente las toallas higiénicas. Trate de evitar el uso de calzas interiores de malla, ropa interior de nylon y jeans ajustados. Trate de evitar el lavado con jabones perfumados o el uso de desodorantes vaginales.

No se lave con esponjas o toallas de baño frotando con fuerza, y evite baños calientes con aceites fuertemente perfumados. El producto no debe utilizarse al mismo tiempo con tampones, duchas vaginales, espermicidas, productos de látex como preservativos y diafragmas. No debe iniciar el tratamiento durante la menstruación, o bien, procurar terminarlo antes de la misma.

Si ha presentado más de 2 infecciones por candida en los últimos 6 meses, antes de emplear el producto consulte a su médico. Si es menor de 16 años o mayor de 60, antes de emplear este producto consulte a su médico. Este medicamento solo debe ser utilizado en forma intravaginal. No coloque el producto en la boca ni lo ingiera. Si el producto es deglutido accidentalmente llame a su médico de inmediato o concurra al hospital más cercano. Evite el contacto con los ojos. Se recomienda no tener relaciones sexuales durante el uso de esta medicación ya que la infección puede ser transferida a su pareja. Cuando se utilizan productos vaginales de base oleosa (óvulos o cremas) la seguridad y eficacia de los productos de látex como ser preservativos se encuentra disminuida. Los síntomas de la micosis vaginal deben desaparecer dentro de los 7 días de iniciado el tratamiento. Si no observa mejoría después de 7 días consulte a su médico. Visite a su médico lo antes posible y no use este producto en caso de presentar cualquiera de los siguientes síntomas: hemorragia vaginal; dolor en la parte baja del abdomen; dolor de espalda, dolor que se irradia al hombro, fiebre (38°C o mayor); náuseas; secreción vaginal con olor fétido. En casos aislados pueden presentarse reacciones secundarias locales pasajeras, como por ejemplo irritación, sensación de quemazón y picor, que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico. Con el uso del producto pueden aparecer reacciones alérgicas, ampollas, molestias, dolor, edema, irritación, descamación, picazón, ardor, dolor abdominal. Las reacciones adversas son similares a los síntomas de la micosis vaginal. Si observa que el enrojecimiento, el ardor y la irritación empeoran, consulte a su médico inmediatamente.

¿CÓMO USAR LOMECAN V OVULOS?

Tras lavarse bien las manos, introducir un óvulo cuidadosamente con el dedo, profundamente dentro de la vagina, por la noche, durante 3 días. La aplicación se realiza con mayor facilidad en posición acostada y con las piernas ligeramente flexionadas. La duración del tratamiento es de 3 días. Si los síntomas persisten por más de 7 días usted debe consultar al médico.